

Bronchoskopie Vorbereitung für

Pat.- Etikett

Wiener Gesundheitsverbund
Standort Penzing der Klinik Ottakring
Abteilung für Atemwegs – und Lungenkrankheiten
Vorstand:
Prim.a Priv.Doz.in Dr.in Marie-Kathrin Breyer
1140 Wien, Sanatoriumstraße 2
Tel: +43 1 910 60 42710
Fax: +43 1 910 60 41719
standort-penzing.gesundheitsverbund.at

**Bitte die benötigten Befunde mit der*dem
Patient*in mitschicken:
(nicht älter als 3 Tage)**

Labor:

- GOT GPT GGT, ChE, Bili, LDH, CK, BUN, Krea, Na, K, Ca, Glucose,CRP,
- KBB + Diff., PRO-BNP
- Gerinnung
- TSH
- Blutgruppe
- weiteres: Venenverweilkanüle

Untersuchungen:

- EKG
- RR
- Arterielle Blutgasanalyse

Röntgen:

- Thorax – CT

Sonstiges:

- Präanästhesie – Begutachtung **MIT** aktuellem Behandlungsverlauf und Anamnese + allgemeine Narkoserevers;
- Bronchoskopie-Revers für starre und flexible Bronchoskopie
- Bronchoskopie Zuweisung/ Konsiliarzettel per Mail an kpe.pulmo.bronchologie@gesundheitsverbund.at
- Bitte NUR Krankentransport bestellen, KEIN Fahrtendienst
- Für **nicht** WIGEV Kliniken zusätzlich Einwilligungserklärung für Befundübermittlung mit der Unterschrift von Patient*in

Bitte die*den Patient*in am um 07:30 Uhr zu Pav. Hermann Parterre NÜCHTERN überstellen zur Bronchoskopie!

! NÜCHTERN !: Präoperative Nüchternheit: ab Mitternacht vor der Untersuchung, Wasser bis 2 Stunden vor der Anästhesieeinleitung! Regelmäßige Therapien wie z.B Antihypertensiva, Schmerztherapie etc. auch am Tag der Bronchoskopie verabreichen.

METFORMIN - haltige Präparate bitte 24 Stunden präoperativ pausieren (letzte Einnahme: Morgendosierung des Vortages).
Postoperative Wiederaufnahme der Einnahme von **Metformin** - haltigen Präparate: zugleich mit der Wiederaufnahme der oralen Ernährung.

Für weitere Fragen oder zur Stornierung der Untersuchung wenden Sie sich bitte an die Bronchologie Hermann Parterre: Telefonnummer: 01- 91060 – 41713.

Folgende ANTIKOAGULANTIEN müssen vor der Bronchoskopie pausiert werden:

Marcoumar bis Normotest > 60%

Neue orale Antikoagulantien (z.B. Xarelto, Eliquis, Pradaxa):
GFR > 50ml/min: 1-2 Tage vorher, GFR < 50ml/min 2-4 Tage vorher.

Clopidogrel (Plavix), Efient, Brilique: 7 Tage

Niedermolekulares Heparin (Lovenox, etc.): 1 Tag

Metforminhältige Antidiabetica (Glucophage, Diabetex, etc.): 1 Tag

(ThromboASS muss nicht pausiert werden).